

Bắt đầu hành trình điều trị của quý vị với RINVOQ

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ở khoa thấp khớp đã được kê đơn RINVOQ



Để biết thêm thông tin và tài nguyên hữu ích, hãy truy cập www.rinvoq.com.au và nhập mã truy cập: **ASPIRE**



Tại sao lại là RINVOQ và tại sao lại ở thời điểm này?

Trước thời điểm này, quý vị có thể đã nhận được các loại thuốc khác để điều trị cho tình trạng viêm của mình. Tuy nhiên, quý vị có thể chưa đáp ứng đủ với những loại thuốc này. Do vậy, bác sĩ của quý vị đã quyết định kê RINVOQ cho tình trạng viêm của quý vị.

Tập sách này chứa thông tin bổ sung về việc điều trị với RINVOQ của quý vị và giải đáp cho những thắc mắc mà quý vị có thể có.

Để biết thêm thông tin và tài nguyên hữu ích, hãy truy cập www.rinvoq.com.au và dùng mã truy cập '**ASPIRE**' để truy cập

Tập sách này bổ sung cho Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng. Luôn tham khảo Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng trước khi bắt đầu điều trị với RINVOQ. Quý vị có thể truy cập tài liệu này trực tuyến tại www.rinvoq.com.au hoặc bằng cách quét mã QR ở mặt sau của tập sách này hoặc trên bao bì sản phẩm. Trang web RINVOQ yêu cầu mã truy cập để có thể truy cập.

Hãy trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về phương pháp điều trị của mình.

Mục lục

- 04** Tại sao lại là RINVOQ?
- 06** Những điều quý vị cần biết trước khi dùng RINVOQ
- 08** Những điều cần chú ý trước khi dùng RINVOQ
- 10** Dùng RINVOQ
- 12** Những điều quý vị cần biết về việc định liều RINVOQ
- 14** Những tác dụng phụ có thể gặp phải cần lưu ý
- 16** Lời khuyên về việc đưa RINVOQ vào thói quen hàng ngày của quý vị
- 18** www.rinvoq.com.au – để tìm hiểu những điều quý vị cần biết về việc điều trị bằng RINVOQ

Tại sao lại là RINVOQ?

RINVOQ là một loại thuốc dùng để điều trị các tình trạng viêm, viêm khớp dạng thấp (rheumatoid arthritis, RA), bệnh viêm khớp vẩy nến (psoriatic arthritis, PsA) và viêm cột sống dính khớp (ankylosing spondylitis, AS).¹

Quý vị đã được kê đơn RINVOQ (còn được gọi là upadacitinib) để điều trị tình trạng viêm của mình. Trước khi được kê RINVOQ, quý vị có thể đã được điều trị với các loại thuốc khác. Bác sĩ hoặc y tá sẽ tư vấn cho quý vị loại thuốc nào trong những thuốc này mà quý vị nên tiếp tục dùng cùng với RINVOQ.²

RINVOQ là gì?

RINVOQ là một loại thuốc dạng viên nén có liều lượng 15mg, dùng một lần mỗi ngày để điều trị tình trạng viêm tiềm ẩn có thể gây ra các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng của quý vị. Những triệu chứng này bao gồm:¹

RA – đau khớp, nhạy cảm đau ở khớp, cứng khớp và sưng ở khớp


PsA – đau, cứng, sưng tại và quanh khớp, đau và cứng ở cột sống, phát ban da dạng vẩy nến và mệt mỏi

AS – đau lưng, gồm cả đau lưng vào ban đêm, cứng và viêm ở cột sống.



RINVOQ hoạt động như thế nào?

RINVOQ chứa thành phần hoạt tính upadacitinib, đây là chất ức chế Janus Kinase (JAK). Các enzym JAK phát ra tín hiệu trong hệ miễn dịch của cơ thể gây ra viêm. RINVOQ hoạt động để khóa những tín hiệu này, qua đó giảm viêm và giảm hình thành các tế bào miễn dịch trong cơ thể.¹



RINVOQ có thể giúp tôi như thế nào?

Bằng cách giảm hoạt động của Janus Kinase, RINVOQ có thể giúp giảm:¹

RA	PsA	AS
- Đau khớp & nhạy cảm đau ở khớp - Cứng ở khớp - Sưng ở khớp	- Đau - Cứng - Sưng ở và quanh khớp - Đau và cứng ở cột sống - Phát ban da dạng vẩy nến - Mệt mỏi - Làm chậm tổn thương đến xương và sụn	- Đau lưng, gồm cả đau lưng vào ban đêm - Cứng và viêm ở cột sống

Hãy nhớ rằng, đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị luôn sẵn sàng trợ giúp. Họ có thể là GP, dược sĩ, y tá hoặc bác sĩ chuyên khoa thấp khớp của quý vị. Quý vị cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hoặc bạn bè nếu quý vị cảm thấy cần có ai đó để nói chuyện.

Các tình trạng viêm là những tình trạng mạn tính, do vậy để giúp kiểm soát các triệu chứng, quý vị nên dùng RINVOQ một lần mỗi ngày, theo đơn của bác sĩ.²

Những điều quý vị cần biết trước khi dùng RINVOQ

Không dùng RINVOQ:^{1,2}

- ❌ Nếu quý vị đang dùng một loại thuốc sinh học làm yếu hệ miễn dịch của mình, bao gồm etanercept hoặc adalimumab
- ❌ Nếu quý vị đang dùng một loại thuốc khác được sử dụng để ức chế mạnh hệ miễn dịch của mình, bao gồm azathioprine, cyclosporine và tacrolimus.
- ❌ Nếu quý vị bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của RINVOQ (xem trang cuối của Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng để biết danh sách đầy đủ các thành phần)
- ❌ Sau ngày hết hạn in trên bao bì hoặc nếu bao bì bị rách hoặc có dấu hiệu giả mạo
- ❌ Nếu quý vị bị bệnh lao thể hoạt động
- ❌ Nếu quý vị đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu quý vị hoặc bạn tình của quý vị đang có kế hoạch sinh con, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá của quý vị về những rủi ro và lợi ích liên quan trong khi dùng RINVOQ
- ❌ Để điều trị bất kỳ tình trạng nào khác trừ khi bác sĩ chỉ định.

Nếu quý vị chưa nói với bác sĩ về bất kỳ điều nào ở trên, hãy trao đổi với họ trước khi quý vị bắt đầu dùng RINVOQ.

Xem lại Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng (có sẵn tại www.rinvoq.com.au bằng cách nhập mã truy cập 'ASPIRE') để xem danh sách đầy đủ những điều quý vị cần biết trước khi bắt đầu điều trị bằng RINVOQ.

RINVOQ và các thuốc khác

Một số loại thuốc có thể cản trở RINVOQ và ảnh hưởng đến hiệu quả của RINVOQ.

Quý vị không được dùng RINVOQ nếu quý vị đang dùng một loại thuốc sinh học làm yếu hệ miễn dịch của mình.

Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của RINVOQ:¹

- ⚠️ Các thuốc điều trị hoặc phòng ngừa nhiễm nấm (chẳng hạn như ketoconazole, itraconazole, posaconazole hoặc voriconazole)
- ⚠️ Thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn (như clarithromycin hoặc rifampicin)
- ⚠️ Thuốc dùng để điều trị rối loạn hệ thống thần kinh (như phenytoin).

Một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng khi dùng cùng RINVOQ:

- ⚠️ Các chất ức chế JAK khác (chẳng hạn như tofacitinib và baricitinib)
- ⚠️ Các loại thuốc sinh học ức chế hệ miễn dịch của quý vị (chẳng hạn như etanercept và adalimumab)
- ⚠️ Các loại thuốc được dùng để ức chế hệ miễn dịch (chẳng hạn như azathioprine, ciclosporin và tacrolimus).

Hãy cho bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ biết nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, gồm cả bất kỳ loại vitamin hay thuốc bổ nào quý vị mua không cần toa từ nhà thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm sức khỏe.

Những điều quý vị cần chú ý trước và trong khi điều trị bằng RINVOQ

Xem lại Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng (có sẵn tại www.rinvoq.com.au bằng cách nhập mã truy cập 'ASPIRE') để xem danh sách đầy đủ những điều quý vị cần chú ý trước khi bắt đầu điều trị bằng RINVOQ.

Trao đổi với bác sĩ nếu quý vị bị:¹ Bởi vì:¹

Nhiễm trùng, hoặc nếu quý vị đã từng bị nhiễm trùng mà cứ tái phát.	RINVOQ có thể làm giảm khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể quý vị. Thuốc này có thể làm cho nhiễm trùng quý vị đã mắc nặng hơn hoặc khiến quý vị dễ bị nhiễm trùng mới hơn.
Bệnh lao (tuberculosis, TB), tiền sử mắc bệnh lao, đã tiếp xúc gần với người mắc bệnh lao hoặc đã sống hoặc đi du lịch ở nước ngoài có vấn đề với bệnh lao.	Quý vị có thể cần xét nghiệm để kiểm tra bệnh lao trước khi bắt đầu dùng RINVOQ.
Bị nhiễm herpes zoster hoặc đã bị nhiễm herpes zoster (thủy đậu/bệnh zona).	RINVOQ có thể cho phép bệnh quay trở lại. Hãy cho bác sĩ của quý vị biết nếu quý vị bị phát ban da gây đau đớn có mụn nước trong khi điều trị bằng RINVOQ vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh zona.
Đã bị viêm gan B, là người mang vi-rút gây viêm gan B hoặc quý vị nghĩ mình có thể có nguy cơ mắc viêm gan B hoặc viêm gan C.	Bác sĩ của quý vị cần nhắc yếu tố này trong quá trình theo dõi.
Gần đây đã có hoặc có kế hoạch dùng vắc-xin (chủng ngừa).	Một số vắc-xin, chẳng hạn như vắc-xin sống, không nên dùng trong khi quý vị đang dùng RINVOQ. Kiểm tra với bác sĩ của quý vị trước khi quý vị nhận bất kỳ chủng ngừa nào.
Đã mắc ung thư, bao gồm ung thư da và u lympho.	Quý vị nên nói với bác sĩ nếu quý vị nhận thấy bất kỳ đốm mới hoặc đốm thay đổi nào trên da của mình. Bác sĩ sẽ quyết định xem quý vị vẫn có thể dùng RINVOQ được hay không.
Đã có cục máu đông, ví dụ ở chân (huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis, DVT)) hoặc ở phổi (tắc mạch phổi).	Gặp bác sĩ ngay lập tức nếu quý vị có các dấu hiệu của cục máu đông, chẳng hạn như chân bị sưng đau, cảm thấy khó thở hoặc đau ngực.
Các vấn đề về gan hoặc thận hoặc nếu quý vị bị huyết áp cao, cholesterol cao hoặc số lượng tế bào máu thay đổi.	Quý vị có thể cần xét nghiệm máu trước khi bắt đầu dùng RINVOQ, hoặc trong khi quý vị đang dùng RINVOQ. Điều này là nhằm kiểm tra xem quý vị có số lượng hồng cầu thấp (thiếu máu), số lượng bạch cầu thấp (giảm bạch cầu trung tính hoặc giảm bạch huyết bào), cholesterol cao hay men gan cao.
Lên kế hoạch có thai, bạn tình của quý vị có kế hoạch mang thai, hoặc quý vị hoặc bạn tình của quý vị đang có thai, đang cho con bú hoặc đang có kế hoạch cho con bú.	Bác sĩ sẽ thảo luận với quý vị về những rủi ro và lợi ích của việc điều trị bằng RINVOQ. Không nên dùng RINVOQ trong thai kỳ hoặc trong thời gian cho con bú.

Quý vị phải luôn dùng tất cả các loại thuốc đã được kê đơn cho quý vị. Không ngưng dùng thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ của quý vị. Hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.



Dùng RINVOQ

Để điều trị RA, PsA và AS, hãy dùng RINVOQ như sau:¹



Một viên mỗi ngày với một ly nước đầy



Vào cùng thời điểm mỗi ngày - cùng hoặc không cùng với đồ ăn




Dưới dạng viên nén nguyên vẹn - không chia nhỏ, nghiền nát hoặc nhai thuốc



Trong khoảng thời gian mà bác sĩ chỉ định cho quý vị - hãy tiếp tục dùng thuốc ngay cả khi quý vị cảm thấy tốt hơn

Cách bảo quản RINVOQ:¹



Ở nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C (RINVOQ không cần bảo quản trong tủ lạnh). Bảo quản thuốc trong gói vỉ ban đầu để bảo vệ tránh ẩm. Vui lòng trao đổi với dược sĩ của quý vị nếu RINVOQ tiếp xúc với nhiệt độ trên 30°C.



Không bảo quản RINVOQ trong phòng tắm, gần bồn rửa, trên bề mặt cửa sổ hoặc trong xe hơi.



Tránh xa tầm mắt và tầm với của trẻ em - trong tủ khóa kín cách mặt đất ít nhất 1,5 mét là nơi tốt để cất giữ thuốc.

Hãy nhớ rằng, không dùng RINVOQ nếu đã hết hạn. Nếu quý vị cần vứt bỏ thuốc RINVOQ, không vứt bỏ dưới dạng rác thải gia đình, hãy hỏi dược sĩ của quý vị cách vứt bỏ thuốc đúng cách.¹

Những điều quý vị cần biết về cách dùng liều RINVOQ¹

Nếu tôi bỏ lỡ một liều thì sao?

Dùng liều đó ngay khi quý vị nhớ ra miễn là ít nhất 10 giờ trước liều tiếp theo. Nếu không, hãy bỏ qua liều quý vị đã bỏ lỡ và dùng liều tiếp theo khi đến thời điểm dùng thuốc.

Nếu tôi quên liều thuốc trong cả ngày thì sao?

Bỏ qua liều đã quên và chỉ dùng một liều như bình thường vào ngày hôm sau. Không dùng liều gấp đôi để bù cho viên thuốc đã bị quên.

Tôi có thể bỏ qua một liều nếu các triệu chứng của tôi đã cải thiện không?

Không. Không ngưng dùng RINVOQ hoặc bỏ qua một liều trừ khi bác sĩ chỉ dẫn quý vị làm vậy. RINVOQ giúp kiểm soát tình trạng của quý vị chứ không chữa khỏi. Viêm khớp dạng thấp (RA), viêm khớp vảy nến (PsA) và viêm cột sống dính khớp (AS) là các tình trạng mạn tính và ngưng hoặc gián đoạn điều trị có thể khiến các triệu chứng của quý vị trở nên tồi tệ hơn, ngay cả khi quý vị đang cảm thấy tốt hơn.³ Điều quan trọng là tiếp tục dùng thuốc ngay cả khi quý vị cảm thấy khỏe.

Nếu tôi dùng quá nhiều thì sao?

Liên hệ ngay với bác sĩ hoặc Trung tâm thông tin về chất độc (13 11 26) để được tư vấn hoặc đến Khoa tai nạn và cấp cứu tại bệnh viện gần nhất, ngay cả khi quý vị không gặp phải bất kỳ dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ độc nào.

RINVOQ khác với các loại thuốc khác tôi đang dùng như thế nào?

RINVOQ giúp giảm viêm tiềm ẩn gây ra các triệu chứng của quý vị và có thể tác dụng khác so với các loại thuốc khác mà quý vị có thể đang dùng. Mỗi loại thuốc quý vị đã được kê đơn đóng một vai trò cụ thể và xác định trong sức khỏe tổng thể của quý vị. Để đạt được kết quả lớn nhất từ kế hoạch điều trị, hãy dùng tất cả các loại thuốc quý vị được kê đơn - luôn luôn hỏi nếu của quý vị không chắc chắn.

Tôi thường được tiêm để điều trị tình trạng viêm của mình, tại sao bây giờ tôi lại dùng thuốc dạng viên nén?

Trước đây quý vị có thể đã dùng thuốc điều trị tình trạng viêm mà yêu cầu phải tiêm. Thành phần hoạt tính của RINVOQ được cung cấp dưới dạng viên nén.

RINVOQ có ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc của tôi không?

Không chắc là RINVOQ sẽ ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc của quý vị.

Tôi có thể uống rượu trong khi dùng RINVOQ không?

Không có thông tin về ảnh hưởng của việc dùng RINVOQ với rượu.

Những tác dụng phụ có thể gặp phải

Giống như tất cả các loại thuốc, RINVOQ có thể gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, mỗi người lại khác nhau. Một số người có thể gặp tác dụng phụ, còn những người khác thì không. Hãy chắc chắn quý vị báo với bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của mình càng sớm càng tốt nếu quý vị bắt đầu cảm thấy không khỏe trong khi dùng RINVOQ.

Nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị gặp bất kỳ trong số những tác dụng phụ ít nghiêm trọng hơn sau đây và chúng đang làm quý vị lo lắng¹

- Đau hoặc ngứa họng
- Tắc hoặc sổ mũi
- Sốt
- Cảm thấy khó chịu ở dạ dày
- Tăng cân
- Mụn trứng cá
- Lở môi

Hãy gọi ngay cho bác sĩ nếu quý vị thấy bất kỳ trong số những tác dụng phụ nghiêm trọng sau¹

RINVOQ có thể làm giảm khả năng của cơ thể chống lại nhiễm trùng, và khiến nhiễm trùng mà quý vị đã mắc nặng hơn, hoặc khiến quý vị dễ bị nhiễm trùng mới hơn. Trong một số trường hợp, nhiễm trùng có thể đe dọa tính mạng. **Hãy báo cho bác sĩ của quý vị sớm nhất có thể** nếu quý vị nhận thấy bất kỳ trong số những dấu hiệu sau:

Các dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng

- Sốt, đổ mồ hôi hoặc ớn lạnh
- Đau cơ
- Cảm thấy khó thở
- Tiêu chảy
- Ho
- Đau dạ dày
- Các vết loét da nóng, đỏ hoặc đau trên cơ thể
- Sụt cân
- Cảm thấy mệt hoặc thiếu sinh lực
- Nóng rát khi đi tiểu hoặc đi tiểu thường xuyên hơn

Các dấu hiệu rối loạn máu

- Sưng ở các tuyến trên cổ, nách hoặc háng

Da

- Phát ban da gây đau kèm mụn nước
- Những thay đổi đối với bất kỳ đốm hay vết loét trên da nào
- Các đốm hoặc vết loét mới trên da

Đến thẳng Phòng cấp cứu tại bệnh viện gần nhất nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu nào trong số những dấu hiệu của các tác dụng phụ rất nghiêm trọng sau:

Các dấu hiệu phản ứng dị ứng

- Khó thở hoặc khó nuốt
- Ngứa da nghiêm trọng, kèm phát ban hoặc mụn sưng
- Sưng mặt, môi, lưỡi hoặc họng

Các dấu hiệu của bệnh lao

- Sốt, đổ mồ hôi về đêm
- Ho nặng không hết
- Ớn lạnh
- Có máu trong đờm
- Khó thở
- Sụt cân

Các dấu hiệu về tác động của cục máu đông

- Đau, mẩn đỏ hoặc sưng ở chân
- Đau ngực hoặc khó thở

Các dấu hiệu của viêm phổi

- Sốt, ớn lạnh
- Khó thở
- Ho, đôi khi kèm đờm
- Đau ngực.
- Cảm thấy mệt hoặc thiếu sinh lực

Để biết thêm chi tiết về các tác dụng phụ có thể xảy ra, hãy xem lại Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng (có sẵn tại www.rinvoq.com.au bằng cách điền mã truy cập '**ASPIRE**'). Hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị nếu quý vị nhận thấy bất cứ điều gì khác khiến quý vị cảm thấy không khỏe. Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở đây có thể xảy ra ở một số người.

Bác sĩ có thể yêu cầu quý vị tạm thời ngừng điều trị bằng RINVOQ nếu quý vị bị nhiễm trùng nặng hoặc nếu kết quả xét nghiệm máu của quý vị nằm ngoài phạm vi bình thường. Nếu điều này xảy ra, bác sĩ sẽ cho quý vị biết khi nào quý vị có thể bắt đầu dùng RINVOQ trở lại.

Lời khuyên về việc đưa RINVOQ vào thói quen hàng ngày của quý vị



Chọn đúng thời điểm phù hợp với quý vị

Quý vị nên dùng RINVOQ vào cùng một thời điểm mỗi ngày, vì vậy chọn thời điểm phù hợp với quý vị là điều quan trọng. Dùng RINVOQ ngay sau một trong những hoạt động hàng ngày của quý vị (chẳng hạn như đánh răng) có thể hữu ích. Quý vị không cần lập kế hoạch dùng thuốc vào khoảng thời gian quanh bữa ăn. Có thể dùng RINVOQ cùng hoặc không cùng thức ăn.



Tạo một trình tự tự chăm sóc

Quý vị có thể thêm việc dùng RINVOQ vào thời gian biểu quý vị dành để chăm sóc bản thân như sau khi ngồi thiền hoặc tập giãn cơ 10 phút.



Đặt một lời nhắc

Đặt lời nhắc trên điện thoại hoặc trên lịch ở một nơi dễ nhìn để giúp quý vị nhớ dùng RINVOQ mỗi ngày.

Quý vị luôn có thể yêu cầu một thành viên trong gia đình nhắc mình - có nhiều hơn một lời nhắc sẽ giúp quý vị nhớ dùng thuốc hơn.



Luôn tạo động lực cho mình

Đừng quên lý do tại sao quý vị dùng RINVOQ - tuân thủ lịch biểu và hình thành thói quen tốt để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Quý vị bị tình trạng viêm mạn tính. Điều quan trọng cần nhớ là dùng thuốc điều trị hàng ngày theo đơn, ngay cả khi quý vị đang cảm thấy khỏe. Dùng RINVOQ mỗi ngày giúp duy trì hàm lượng thuốc ổn định trong cơ thể để mang lại cơ hội thành công cao nhất trong điều trị tình trạng của quý vị.³

www.rinvoq.com.au – để tìm hiểu những điều quý vị cần biết về việc điều trị bằng RINVOQ

Truy cập www.rinvoq.com.au để biết những lời khuyên và thông tin thiết thực về việc điều trị bằng RINVOQ của quý vị, bao gồm:



Các câu hỏi thường gặp về RINVOQ



Lời khuyên để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc, dành riêng để hỗ trợ cho những người bị các tình trạng viêm



Lời nhắc dùng thuốc và thuốc theo toa cho điện thoại và email của quý vị



Tiếp cận với huấn luyện viên sức khỏe

Huấn luyện viên sức khỏe của chúng tôi là các nhà sinh lý học tập thể dục, chuyên gia chế độ ăn uống và nhà dinh dưỡng học có trình độ, những người có thể thúc đẩy động lực và giúp quý vị phát triển một kế hoạch điều trị phù hợp với tình trạng và lối sống của quý vị.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.rinvoq.com.au và điền mã truy cập '**ASPIRE**'

Trang web này cung cấp thông tin chung cho những người đã được kê đơn dùng RINVOQ. Thông tin trên đó không thay thế cho tư vấn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Nguồn trợ giúp khác

Các tổ chức bên ngoài sau đây cung cấp các tài nguyên và thông tin cho những người sống chung với tình trạng viêm. Dưới đây là một vài lựa chọn, nhưng quý vị có thể tham khảo rất nhiều nguồn khác nữa.



www.arthritisaustralia.com.au



www.dragonclaw.net



www.creakyjoints.org.au



MUSCULOSKELETAL
AUSTRALIA

www.msk.org.au



Quý vị có thể truy cập bản sao Tờ thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng (Consumer Medicine Information, CMI) và các thông tin hữu ích khác về RINVOQ bằng cách quét mã QR.

Tài liệu tham khảo: 1. RINVOQ Consumer Medicine Information. 2. RINVOQ Approved Product Information. 3. Healthline. Medication Administration: Why It's Important To Take Drugs the Right Way. Có tại: www.healthline.com/health/administration-of-medication [Đã truy cập tháng 2 năm 2021].

AbbVie® là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của AbbVie Inc. và RINVOQ® là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của AbbVie Biotechnology Ltd. AbbVie Pty Ltd, ABN 48 156 384 262, Mascot NSW 2020.

Số điện thoại cung cấp thông tin y tế: 1800 043 460. www.abbvie.com.au. AU-RNQ-210065. July 2021.

abbvie